I'm not a bot

a mi bebé de casi 4 meses le recetaron bregamin gotas 10 gotas.pero los abuelos dicen que otro doctor le dijeron que no es recomendable dárselo ya que le daña su higado, es cierto? Dra. Gabriela Mendoza Alvarez ¡Buen día! El medicamento contiene un antihistamínico que esta indicado en episodios de mucha producción de moco como cuando tu pequeño se enferma de gripa o tiene algún proceso inflamatorio en las vías aéreas superiores. Este medicamento nos va a ayudar a disminuir esa producción, es cierto que el medicamento se metaboliza en el hígado como casi todos los medicamentos, pero esto no quiere decir que se vea afectado, siempre y cuando la dosis sea la adecuada y es cierto que ciertos antihistamínicos no son tan recomendables en pequeños menores de uno o dos años, ojo, esto no quiere decir que no deban ser utilizados. Para el alivio de la congestión nasal se usan aseos nasales, que son muy útiles para la movilización del moquito a cualquier edad. Bregamin es un medicamento antigripal cuyos componentes principales son Clorfenamina, Fenilefrina y paracetamol, tres sustancias con propiedades para controlar malestares simples y algunas afecciones comunes del sistema respiratorio. Por ello, este medicamento es ideal para tratar: Resfriado común, una de las enfermedades más comunes, que cursa con malestar general, tos, nariz tapada y estornudos; suele durar hasta dos semanas y aunque no tiene cura, es posible controlar sus síntomas. Gripa o influenza, una infección viral que afecta el sistema respiratorio generalmente una vez al año, y que suele ser similar a un resfriado, pero a diferencia de este sus síntomas suelen ser más intensos, además de causar fiebre y dolores de cabeza. Rinitis alérgica, una reacción producida por una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante estímulos simples como el polen o el pelo de las macotas, que causa congestión nasal, comezón en la nariz y lagrimeo. Los beneficios de Bregamin se deben a que combina los efectos antialérgicos que tiene la Clorfenamina con la capacidad de contraer los vasos sanguíneos de la mucosa nasal de la Fenilefrina lo que disminuye la congestión nasal y la inflamación de garganta; mientras que las propiedades del paracetamol ayudan a disminuir la fiebre y calmar el dolor y el malestar general. Bregamin Precios Compara los precios de las distintas presentaciones de este fármaco en el siguiente cuadro. Precio de Bregamin Farmacias Gi Farmacia del Niño Mexipharmacy Tabletas $19.00 $23.54 $23.54 Jarabe $27.00 – – **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Te recomendamos que te dirijas a las sucursales de Farmacias Gi, debido a que esta franquicia te ofrece el mejor precio para la presentación en tabletas. Además de esto, durante nuestra investigación sólo pudimos encontrar la presentación en jarabe en la tienda en línea de dicha farmacia. Por otro lado, tanto Farmacia del Niño como Mexipharmacy cuentan con un precio más alto para las tabletas cuya diferencia es del 21%. Presentaciones y formas de Administración Jarabe de 120 ml en frasco con 0.2 g de Clorfenamina más 0.4 g de Fenilefrina como Bregamin, elaborado por Fármacos continentales. Gotas en solución de 15 ml en frasco gotero con 2 mg de Clorfenamina más 5 mg de Fenilefrina y 60mg de paracetamol como Bregamin solución elaborado por Fármacos continentales. Tabletas con 4 mg de Clorfenamina más 5 mg de Fenilefrina y 300 mg de paracetamol como Bregamin tabletas elaborado por Fármacos continentales. Dosis Recomendadas por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Jarabe Una cucharada Dos cucharadas 3 – 4 Gotas en solución 10 a 25 gotas No 3 – 4 Tabletas No 1 a 2 3 – 4 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: para niños mayores de un año se encuentra disponible la presentación en gotas, para su uso se recomiendan de 10 a 25 gotas, tomando en consideración las variaciones de edad y peso recomendadas por el médico. Mientras que la presentación en jarabe solo se recomiendan para niños mayores de 6 años, y las tabletas son reservadas para mayores de 12 años. En cuanto a la duración del tratamiento, la recomendación general del fabricante es consumir una dosis cada 6 u 8 horas por un periodo no mayor a 5 días. Generales: Es importante usar con precaución Bregamin en aquellos pacientes con problemas cardiovasculares como, hipertensión arterial, así como en pacientes con problemas renales, hipertrofia prostática o hipertiroidismo, asimismo debe ser usado con precaución en pacientes diabéticos ya que contiene un 50% de azúcar . Alergias: Este medicamento no debe ser consumido por aquellas personas que hayan presentado alergias a Fenilefrina, Clorfenamina o Paracetamol. Mezcla con alcohol: No se recomienda mezclar este medicamento con alcohol ya que puede aumentar los efectos sedantes de la Clorfenamina, y el metabolismo del paracetamol. Mezclar con otros medicamentos. Los componentes de Bregamin, generalmente son compatibles con otros medicamentos, sin embargo pueden llegar a interactuar con otros medicamentos depresores del sistema central como diazepam, además puede alterar los efectos de sulfonilureas como Sulfametoxazol o Pioglitazona y disminuir los efectos de la heparina. Compatibilidad de Bregamin en Embarazo y Lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO El uso de Bregamin no se recomienda durante el embarazo: a pesar que de acuerdo con lo publicado por facmed unam algunos de sus componentes como el Paracetamol son seguros durante el embarazo, otros como la Clorfenamina aún no han sido estudiados lo suficiente, por lo que su uso se reserva para aquellos casos en los que los beneficios sean superiores a los riesgos. El uso de Bregamin no es recomendado durante la lactancia materna, ya que según informes de e-lactancia a pesar de que es poco probable que la Fenilefrina aparezca en la leche materna, su uso prolongado pude alterar la presión arterial, además está comprobado que la Clorfenamina puede llegar a disminuir la producción de leche materna si se utiliza durante las primeras semanas después del parto, mientras que sus efectos sedantes pueden resultar peligrosos. Efectos Secundarios La mayoría de las personas aceptan muy bien el Bregamin, no obstante, es posible que se presenten algunos efectos indeseados en menos del 1% de las personas, entre los efectos registrados se encuentran: Sistema nervioso: mareo, vértigo, nerviosismo, somnolencia. Sistema digestivo: pérdida de apetito, nauseas, vomito, estreñimiento, dolor abdominal, sequedad de boca y garganta. Aparato cardiovascular: palpitaciones, hipotensión. Sistema genitourinario: retención urinaria. Otros: urticaria, sudoración excesiva. Es importante que frente a la persistencia de cualquiera de los síntomas mencionados por más de 5 días consulte a su médico inmediatamente. Fuentes médicas Bregamin es un medicamento antigripal cuyos componentes principales son Clorfenamina, Fenilefrina y paracetamol, tres sustancias con propiedades para controlar malestares simples y algunas afecciones comunes del sistema respiratorio. Por ello, este medicamento es ideal para tratar: Resfriado común, una de las enfermedades más comunes, que cursa con malestar general, tos, nariz tapada y estornudos; suele durar hasta dos semanas y aunque no tiene cura, es posible controlar sus síntomas. Gripa o influenza, una infección viral que afecta el sistema respiratorio generalmente una vez al año, y que suele ser similar a un resfriado, pero a diferencia de este sus síntomas suelen ser más intensos, además de causar fiebre y dolores de cabeza. Rinitis alérgica, una reacción producida por una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante estímulos simples como el polen o el pelo de las macotas, que causa congestión nasal, comezón en la nariz y lagrimeo. Los beneficios de Bregamin se deben a que combina los efectos antialérgicos que tiene la Clorfenamina con la capacidad de contraer los vasos sanguíneos de la mucosa nasal de la Fenilefrina lo que disminuye la congestión nasal y la inflamación de garganta; mientras que las propiedades del paracetamol ayudan a disminuir la fiebre y calmar el dolor y el malestar general. Bregamin Precios Compara los precios de las distintas presentaciones de este fármaco en el siguiente cuadro. Precio de Bregamin Farmacias Gi Farmacia del Niño Mexipharmacy Tabletas $19.00 $23.54 $23.54 Jarabe $27.00 – – **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Te recomendamos que te dirijas a las sucursales de Farmacias Gi, debido a que esta franquicia te ofrece el mejor precio para la presentación en tabletas. Además de esto, durante nuestra investigación sólo pudimos encontrar la presentación en jarabe en la tienda en línea de dicha farmacia. Por otro lado, tanto Farmacia del Niño como Mexipharmacy cuentan con un precio más alto para las tabletas cuya diferencia es del 21%. Presentaciones y formas de Administración Jarabe de 120 ml en frasco con 0.2 g de Clorfenamina más 0.4 g de Fenilefrina como Bregamin, elaborado por Fármacos continentales. Tabletas con 4 mg de Clorfenamina más 5 mg de Fenilefrina y 300 mg de paracetamol en caja con 12 unidades como Bregamin tabletas elaborado por Fármacos continentales. Dosis Recomendadas por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Jarabe Una cucharada Dos cucharadas 3 – 4 Gotas en solución 10 a 25 gotas No 3 – 4 Tabletas No 1 a 2 3 – 4 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: para niños mayores de un año se encuentra disponible la presentación en gotas, para su uso se recomiendan de 10 a 25 gotas, tomando en consideración las variaciones de edad y peso recomendadas por el médico. Mientras que la presentación en jarabe solo se recomiendan para niños mayores de 6 años, y las tabletas son reservadas para mayores de 12 años. En cuanto a la duración del tratamiento, la recomendación general del fabricante es consumir una dosis cada 6 u 8 horas por un periodo no mayor a 5 días. Generales: Es importante usar con precaución Bregamin en aquellos pacientes con problemas cardiovasculares como, hipertensión arterial, así como en pacientes con problemas renales, hipertrofia prostática o hipertiroidismo, asimismo debe ser usado con precaución en pacientes diabéticos ya que contiene un 50% de azúcar . Alergias: Este medicamento no debe ser consumido por aquellas personas que hayan presentado alergias a Fenilefrina, Clorfenamina o Paracetamol. Mezcla con alcohol: No se recomienda mezclar este medicamento con alcohol ya que puede aumentar los efectos sedantes de la Clorfenamina, y el metabolismo del paracetamol. Mezclar con otros medicamentos. Los componentes de Bregamin, generalmente son compatibles con otros medicamentos, sin embargo pueden llegar a interactuar con otros medicamentos depresores del sistema central como diazepam, además puede alterar los efectos de sulfonilureas como Sulfametoxazol o Pioglitazona y disminuir los efectos de la heparina. Compatibilidad de Bregamin en Embarazo y Lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO El uso de Bregamin no se recomienda durante el embarazo: a pesar que de acuerdo con lo publicado por facmed unam algunos de sus componentes como el Paracetamol son seguros durante el embarazo, otros como la Clorfenamina aún no han sido estudiados lo suficiente, por lo que su uso se reserva para aquellos casos en los que los beneficios sean superiores a los riesgos. El uso de Bregamin no es recomendado durante la lactancia materna, ya que según informes de e-lactancia a pesar de que es poco probable que la Fenilefrina aparezca en la leche materna, su uso prolongado pude alterar la presión arterial, además está comprobado que la Clorfenamina puede llegar a disminuir la producción de leche materna si se utiliza durante las primeras semanas después del parto, mientras que sus efectos sedantes pueden resultar peligrosos. Efectos Secundarios La mayoría de las personas aceptan muy bien el Bregamin, no obstante, es posible que se presenten algunos efectos indeseados en menos del 1% de las personas, entre los efectos registrados se encuentran: Sistema nervioso: mareo, vértigo, nerviosismo, somnolencia. Sistema digestivo: pérdida de apetito, nauseas, vomito, estreñimiento, dolor abdominal, sequedad de boca y garganta. Aparato cardiovascular: palpitaciones, hipotensión. Sistema genitourinario: retención urinaria. Otros: urticaria, sudoración excesiva. Es importante que frente a la persistencia de cualquiera de los síntomas mencionados por más de 5 días consulte a su médico inmediatamente. Fuentes médicas Denominación genérica: Amantadina, Clorfenamina y Paracetamol.Forma farmacéutica y formulación: Jarabe. Cada 100 mL de jarabe contienen: Clorhidrato de amantadina 0.500 g. Maleato de Clorfenamina 0.020 g. Paracetamol 3.000 g. Vehículo c.b.p. 100.00 mL.Indicaciones terapéuticas: Bregamin®AV está indicado para el alivio de la gripe de origen viral (influenza tipo A) al poseer acción antiviral específica, antihistamínica, descongestiva, antipirética y analgésica. También es auxiliar para el alivio de algunas de la rinitis alérgica y fiebre del heno.Farmacocinética y farmacodinamia: El Clorhidrato de amantadina es un antivírico que inhibe la réplica o duplicación del virus de influenza A. Se ha observado una actividad variable in vitro frente a otros virus. El clorhidrato de amantadina se absorbe fácilmente en el tubo digestivo; las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan al cabo de 4 horas siendo de 0.3 a 0.6 mg/mL después de la administración de una dosis de 200 mg. La sustancia se excreta principalmente en la orina de forma inalterada por filtración glomerular y por secreción tubular, aunque también se han detectado en la orina pequeñas cantidades de un metabolito acetilado; se ha descrito que la semivida de eliminación plasmática es de unas 11 a 15 horas en los pacientes con función renal normal, aunque se prolonga de manera significativa en los ancianos y enfermos con deterioro renal. La velocidad de eliminación puede aumentar por la acidificación de la orina. La amantadina atraviesa las barreras placentaria y hematoencefálica. También se distribuye en leche materna. Se ha descrito que aproximadamente un 67% se une a las proteínas plasmáticas. El Maleato de clorfenamina compite con la histamina por los sitios receptores H1 en células efectoras, evita pero no anula las respuestas mediadas por histaminas. La clorfenamina se absorbe adecuadamente en vías gastrointestinales. Después de la administración de la formulación oral, la concentración sérica pico se dio en un rango de 2.5 a 6 horas. La biodisponibilidad para la clorfenamina es más o menos 0.34. En varios estudios el volumen de distribución ha variado de 4.3 a 7.0 L/kg en niños y de 5.9 a 11.7 L/kg en adultos. El fármaco se metaboliza en gran parte en las células de la mucosa gastrointestinal y en el hígado. En humanos clorfenamina es N-dealquilada a desmetilclorfenamina y didesmetilclorfenamina. Ambos metabolitos alquilados han sido detectados y medidos en plasma y/u orina. Después de la dosis única oral estos metabolitos no fueron siempre detectados en plasma. Cuando fueron administrados 6 mg de clorfenamina cada 12 horas en 9 dosis a dos sujetos la concentración en estado estable en plasma de desmetilclorfenamina fue de 7.6 mg/L mientras que el metabolito de didesmetilclorfenamina fue < 3 mg/L. Después de la dosis única (8 mg) o múltiples dosis en 2 sujetos, el porcentaje excretado en la orina como metabolitos fue muy similar: 21.4 vs 21.6% para desmetilclorfenamina y menor de 3% de didesmetilclorfenamina. En niños la vida media de eliminación de clorfenamina tiene un rango de 9.5 a 13.0 horas mientras el rango de depuración es de 216 a 288 mL/min (5.4 a 7.2 mL/min/kg). La velocidad de depuración en niños no tiene una relación con la edad pero con el peso del cuerpo o la superficie sí. En adultos la vida media de eliminación fue de 14 a 24 horas en diferentes estudios mientras que la velocidad de depuración es de 99 a 348 mL/min (1.4 a 4.7 ml/min/kg). La excreción urinaria de clorfenamina depende del pH. Cuando el pH urinario es ácido (5.0), 20 a 26% de la droga modificada fue encontrada en la excreción después de 24 horas. Cuando la orina fue de un pH alcalino (8.0) sólo 0.3 a 0.4% de droga modificada fue excretada en el mismo periodo. El estado de estabilidad después de la administración oral de clorfenamina fue de 7 días (8 mg cada 12 horas), 18% de la droga modificada fue excretada, 22.5% como desmetilclorfenamina y 4.7% como didesmetilclorfenamina. En niños fue encontrado que la excreción de la clorfenamina y los metabolitos desmetilados decreció cuando el pH de la orina se incrementó y el flujo de la orina decreció. Se inhiben los efectos vasoconstrictores de la histamina y en cierta medida los efectos vasodilatadores más rápidos mediados por dichos receptores en las células endoteliales. Bloquea potentemente la acción de la histamina, lo cual genera la permeabilidad capilar y formación de edema y pápula. Controla las reacciones de hipersensibilidad inmediata: anafilaxia y alergia. El Paracetamol: La absorción y distribución de los derivados del paracetaminofenol se absorben por todas las vías incluyendo la digestiva; siendo bases muy débiles, se absorben algo en el estómago y muy rápidamente en el intestino. Una vez absorbido el paracetamol pasa a la sangre en la que alcanza una concentración plasmática a la hora, a las dos horas después de la ingestión y se combina en 10% con las proteínas. El volumen de distribución, determinado para el paracetamol es alrededor de 1/kg es decir que se distribuye especialmente en los líquidos extra e intracelular; de todas maneras se distribuye en todos los tejidos, su rápida biotransformación hace que los niveles plasmáticos desciendan rápidamente de manera que no existe acumulación por dosis repetidas. De todos modos, el nivel terapéutico de paracetamol en el plasma es de 10 a 20 mg/ml mientras que el nivel tóxico está por encima de 200 mg/mL en cuyo caso es muy probable la aparición de daño hepático. La fenacetina se transforma, especialmente en el hígado, en los microsomas hepáticos, en paracetamol o en N-acetil-p-aminofenol que como se ha dicho, es un potente analgésico y antipirético. El paracetamol aparece en la orina libre un 5% y conjugado con los ácidos sulfúrico y glucurónico cerca del 85% siempre en los microsomas hepáticos. Una pequeña porción de fenacetina se transforma en parafenetidina que pasa luego a para-aminofenol, lo mismo el paracetamol; el para-aminofenol es la sustancia responsable de la producción de metahemoglobinemia, pues se transforma en quinonimina que forma con aquella sustancia un sistema de oxidorreducción en forma tal que el oxígeno implicado oxida la hemoglobina para formar metahemoglobina. Por otra parte el paracetamol puede oxidarse por el citocromo P-450 y da lugar a una hidroxilamina, que es la responsable de la necrosis hepática producida por las dosis tóxicas de paracetamol. Las biotransformaciones y la excreción urinaria de los metabolitos son rápidas y los mismos pueden impartir a la orina un color rojo pardusco. La vida media es de 2.5 horas para el paracetamol. Los efectos terapéuticos con la dosificación oral es de 0.5 horas y la duración es de 4 horas; la concentración en suero transcurre de 40 a 60 min por dosificación oral; la viabilidad en dosis oral es de 60 a 70% y rectal es de 30 a 40%; el volumen de distribución es de 0.8 a 1.36 l/kg; en proteína es de 25 a 50%; la eliminación y vida media es de 2 a 4 horas; extensión hepática y metabolismo es seguida con 1 a 4% excretada intercambiando en la orina y 2.6% en la bilis.Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. A los antihistamínicos con estructuras químicas similares como la dexclorofeniramina, bromfeniramina o la triprolidina, en aquellos que en las dos semanas anteriores han tomado inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO). En pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión o hipertiroidismo por el riesgo de palpitaciones y taquicardia, y en aquellos con enfermedad renal, diabetes, asma bronquial, retención urinaria o úlceras pépticas estenosantes. No debe administrarse en afecciones hepáticas e insuficiencia renal grave. Nefropatía analgésica exige la supresión inmediata de la droga, y si existe insuficiencia renal, la hemodiálisis y aún el trasplante renal. No se administre junto con medicamentos depresores del SNC, ni con bebidas alcohólicas.Precauciones generales: Se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular o hepática, con deterioro de la función renal, eccemas recurrentes o psicosis. Así mismo se debe administrar con precaución a los enfermos ancianos, pacientes desnutridos o alcohólicos crónicos. No se deben ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento ni utilizar durante periodos prolongados. Debido a la somnolencia que produce el medicamento, no deberá administrarse a personas que manejan vehículos o maquinaria de precisión.Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: No debe administrarse este producto durante el embarazo debido a que la seguridad del empleo de este medicamento en estas circunstancias no ha sido establecida. Se han realizado estudios que revelan que los componentes de la fórmula se distribuyen en la leche materna; por lo que no deberá administrarse a mujeres en periodo de lactancia.Reacciones secundarias y adversas: La administración de este producto puede provocar efecto en el causando estimulación ligera o moderada, letargo, mareo, vértigo, trastornos de la coordinación, excitabilidad, sudación excesiva, escalofríos; en el centro venoso: hipotensión y palpitaciones. También se puede presentar anorexia, náuseas, estreñimiento, malestar epigástrico, vómito, sequedad bucal y faríngea; en la vía urinaria, retención urinaria y dificultad para la micción; en vías respiratorias se puede observar espesamiento de secreciones bronquiales, además urticaria, erupción y fotosensibilidad. Los efectos adversos también incluyen trombocitopenia, agranulocitosis, pancitopenia, anemia hemolítica, metahemoglobinemia, hipoglucemia, hipotermia, daño gastrointestinal, pancreatitis, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad con sobredosis, necrosis hepática, neumonitis aguda e hipersensibilidad.Interacciones medicamentosas y de otro género: Los inhibidores de la MAO interfieren con la destoxificación de la clorfenamina y de esta manera prolongan e intensifican sus efectos centrales y anticolinérgicos puede presentarse sedación aditiva cuando los antihistamínicos se administran junto con otros depresores del SNC, como alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, somníferos o fármacos ansiolíticos. La clorfenamina aumenta los efectos de las sulfonilureas y contrarresta parcialmente la acción anticoagulante de la heparina. La metoclopramida, estimula el vaciamiento gástrico y con ésto puede aumentar la absorción intestinal del Paracetamol, así mismo, la propantelina disminuye la absorción de este fármaco. La ingestión de alcohol y antiepilépticos puede aumentar la hepatotoxicidad del paracetamol. La amantadina aumenta los efectos de los antimuscarínicos y asociada con levodopa puede causar reacciones psicóticas. Los fármacos que aumentan el pH de la orina reducen la velocidad de excreción de la amantadina.Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: Con la clorfenamina se debe suspender cuatro días antes de alguna prueba cutánea de diagnóstico. El paracetamol puede interferir en determinaciones del ácido úrico.Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: Hasta el momento no se han reportado.Dosis y vía de administración: Vía de administración: Oral. Dosis: Niños de 3 a 5 años:1 cucharadita (5 mL) cada 8 horas. Niños de 6 a 12 años:1 cucharada (10 mL) cada 8 horas. Niños mayores de 12 años y adultos: 1 cucharada (10 mL) cada 8 horas. Se recomienda iniciar la administración desde el inicio de los síntomas.Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: La sobredosificación puede presentar trastornos gastrointestinales como náusea y vómito, puede causar somnolencia, alucinaciones, excitación, ataxia, convulsiones y depresión del SNC; en niños puede ser grave la sobredosis. En caso de sobredosificación se continuará con un lavado gástrico y un tratamiento sintomático.Presentación(es): Caja con frasco con 60 mL y 120 mL y vaso dosificador.Recomendaciones sobre almacenamiento: Consérvese el frasco bien tapado y a temperatura ambiente a no más de 30°C.Leyendas de protección: Literatura exclusiva para médicos. Este medicamento contiene un antihistamínico. No se administre a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se deje al alcance de los niños. Contiene 50 por ciento de azúcar. En dosis mayores a las recomendadas puede producir lesiones de hígado o de la sangre. No se deben manejar vehículos, no se operen máquinas debido a la somnolencia que provoca el medicamento. Contiene 50 por ciento de azúcar. No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento ni administrarse conjuntamente con medicamentos que actúan en el sistema nervioso.Nombre y domicilio del laboratorio: Fármacos Continentales, S.A. de C.V. Av. San Ignacio No. 1831 Col. Jardines de San Manuel. C.P. 72570. Puebla, Pue., México.Número de registro del medicamento: 245M2012 SSA VI. Este es un listado de algunos de los medicamentos, fármacos relacionados con BREGAMIN AV . Bregamin es un medicamento antigripal cuyos componentes principales son Clorfenamina, Fenilefrina y paracetamol, tres sustancias con propiedades para controlar malestares simples y algunas afecciones comunes del sistema respiratorio. Por ello, este medicamento es ideal para tratar: Resfriado común, una de las enfermedades más comunes, que cursa con malestar general, tos, nariz tapada y estornudos; suele durar hasta dos semanas y aunque no tiene cura, es posible controlar sus síntomas. Gripa o influenza, una infección viral que afecta el sistema respiratorio generalmente una vez al año, y que suele ser similar a un resfriado, pero a diferencia de este sus síntomas suelen ser más intensos, además de causar fiebre y dolores de cabeza. Rinitis alérgica, una reacción producida por una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante estímulos simples como el polen o el pelo de las macotas, que causa congestión nasal, comezón en la nariz y lagrimeo. Los beneficios de Bregamin se deben a que combina los efectos antialérgicos que tiene la Clorfenamina con la capacidad de contraer los vasos sanguíneos de la mucosa nasal de la Fenilefrina lo que disminuye la congestión nasal y la inflamación de garganta; mientras que las propiedades del paracetamol ayudan a disminuir la fiebre y calmar el dolor y el malestar general. Bregamin Precios Compara los precios de las distintas presentaciones de este fármaco en el siguiente cuadro. Precio de Bregamin Farmacias Gi Farmacia del Niño Mexipharmacy Tabletas $19.00 $23.54 $23.54 Jarabe $27.00 – – **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Te recomendamos que te dirijas a las sucursales de Farmacias Gi, debido a que esta franquicia te ofrece el mejor precio para la presentación en tabletas. Además de esto, durante nuestra investigación sólo pudimos encontrar la presentación en jarabe en la tienda en línea de dicha farmacia. Por otro lado, tanto Farmacia del Niño como Mexipharmacy cuentan con un precio más alto para las tabletas cuya diferencia es del 21%. Presentaciones y formas de Administración Jarabe de 120 ml en frasco con 0.2 g de Clorfenamina más 0.4 g de Fenilefrina como Bregamin, elaborado por Fármacos continentales. Gotas en solución de 15 ml en frasco gotero con 2 mg de Clorfenamina más 5 mg de Fenilefrina y 60mg de paracetamol como Bregamin solución elaborado por Fármacos continentales. Tabletas con 4 mg de Clorfenamina más 5 mg de Fenilefrina y 300 mg de paracetamol en caja con 12 unidades como Bregamin tabletas elaborado por Fármacos continentales. Dosis Recomendadas por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Jarabe Una cucharada Dos cucharadas 3 – 4 Gotas en solución 10 a 25 gotas No 3 – 4 Tabletas No 1 a 2 3 – 4 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: para niños mayores de un año se encuentra disponible la presentación en gotas, para su uso se recomiendan de 10 a 25 gotas, tomando en consideración las variaciones de edad y peso recomendadas por el médico. Mientras que la presentación en jarabe solo se recomiendan para niños mayores de 6 años, y las tabletas son reservadas para mayores de 12 años. En cuanto a la duración del tratamiento, la recomendación general del fabricante es consumir una dosis cada 6 u 8 horas por un periodo no mayor a 5 días. Generales: Es importante usar con precaución Bregamin en aquellos pacientes con problemas cardiovasculares como, hipertensión arterial, así como en pacientes con problemas renales, hipertrofia prostática o hipertiroidismo, asimismo debe ser usado con precaución en pacientes diabéticos ya que contiene un 50% de azúcar . Alergias: Este medicamento no debe ser consumido por aquellas personas que hayan presentado alergias a Fenilefrina, Clorfenamina o Paracetamol. Mezcla con alcohol: No se recomienda mezclar este medicamento con alcohol ya que puede aumentar los efectos sedantes de la Clorfenamina, y el metabolismo del paracetamol. Mezclar con otros medicamentos. Los componentes de Bregamin, generalmente son compatibles con otros medicamentos, sin embargo pueden llegar a interactuar con otros medicamentos depresores del sistema central como diazepam, además puede alterar los efectos de sulfonilureas como Sulfametoxazol o Pioglitazona y disminuir los efectos de la heparina. Compatibilidad de Bregamin en Embarazo y Lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO El uso de Bregamin no se recomienda durante el embarazo: a pesar que de acuerdo con lo publicado por facmed unam algunos de sus componentes como el Paracetamol son seguros durante el embarazo, otros como la Clorfenamina aún no han sido estudiados lo suficiente, por lo que su uso se reserva para aquellos casos en los que los beneficios sean superiores a los riesgos. El uso de Bregamin no es recomendado durante la lactancia materna, ya que según informes de e-lactancia a pesar de que es poco probable que la Fenilefrina aparezca en la leche materna, su uso prolongado pude alterar la presión arterial, además está comprobado que la Clorfenamina puede llegar a disminuir la producción de leche materna si se utiliza durante las primeras semanas después del parto, mientras que sus efectos sedantes pueden resultar peligrosos. Efectos Secundarios La mayoría de las personas aceptan muy bien el Bregamin, no obstante, es posible que se presenten algunos efectos indeseados en menos del 1% de las personas, entre los efectos registrados se encuentran: Sistema nervioso: mareo, vértigo, nerviosismo, somnolencia. Sistema digestivo: pérdida de apetito, nauseas, vomito, estreñimiento, dolor abdominal, sequedad de boca y garganta. Aparato cardiovascular: palpitaciones, hipotensión. Sistema genitourinario: retención urinaria. Otros: urticaria, sudoración excesiva. Es importante que frente a la persistencia de cualquiera de los síntomas mencionados por más de 5 días consulte a su médico inmediatamente. Fuentes médicas Bregamin es un medicamento antigripal cuyos componentes principales son Clorfenamina, Fenilefrina y paracetamol, tres sustancias con propiedades para controlar malestares simples y algunas afecciones comunes del sistema respiratorio. Por ello, este medicamento es ideal para tratar: Resfriado común, una de las enfermedades más comunes, que cursa con malestar general, tos, nariz tapada y estornudos; suele durar hasta dos semanas y aunque no tiene cura, es posible controlar sus síntomas. Gripa o influenza, una infección viral que afecta el sistema respiratorio generalmente una vez al año, y que suele ser similar a un resfriado, pero a diferencia de este sus síntomas suelen ser más intensos, además de causar fiebre y dolores de cabeza. Rinitis alérgica, una reacción producida por una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante estímulos simples como el polen o el pelo de las macotas, que causa congestión nasal, comezón en la nariz y lagrimeo. Los beneficios de Bregamin se deben a que combina los efectos antialérgicos que tiene la Clorfenamina con la capacidad de contraer los vasos sanguíneos de la mucosa nasal de la Fenilefrina lo que disminuye la congestión nasal y la inflamación de garganta; mientras que las propiedades del paracetamol ayudan a disminuir la fiebre y calmar el dolor y el malestar general. Bregamin Precios Compara los precios de las distintas presentaciones de este fármaco en el siguiente cuadro. Precio de Bregamin Farmacias Gi Farmacia del Niño Mexipharmacy Tabletas $19.00 $23.54 $23.54 Jarabe $27.00 – – **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Te recomendamos que te dirijas a las sucursales de Farmacias Gi, debido a que esta franquicia te ofrece el mejor precio para la presentación en tabletas. Además de esto, durante nuestra investigación sólo pudimos encontrar la presentación en jarabe en la tienda en línea de dicha farmacia. Por otro lado, tanto Farmacia del Niño como Mexipharmacy cuentan con un precio más alto para las tabletas cuya diferencia es del 21%. Presentaciones y formas de Administración Jarabe de 120 ml en frasco con 0.2 g de Clorfenamina más 0.4 g de Fenilefrina como Bregamin, elaborado por Fármacos continentales. Gotas en solución de 15 ml en frasco gotero con 2 mg de Clorfenamina más 5 mg de Fenilefrina y 60mg de paracetamol como Bregamin solución elaborado por Fármacos continentales. Tabletas con 4 mg de Clorfenamina más 5 mg de Fenilefrina y 300 mg de paracetamol en caja con 12 unidades como Bregamin tabletas elaborado por Fármacos continentales. Dosis Recomendadas por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Jarabe Una cucharada Dos cucharadas 3 – 4 Gotas en solución 10 a 25 gotas No 3 – 4 Tabletas No 1 a 2 3 – 4 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: para niños mayores de un año se encuentra disponible la presentación en gotas, para su uso se recomiendan de 10 a 25 gotas, tomando en consideración las variaciones de edad y peso recomendadas por el médico. Mientras que la presentación en jarabe solo se recomiendan para niños mayores de 6 años, y las tabletas son reservadas para mayores de 12 años. En cuanto a la duración del tratamiento, la recomendación general del fabricante es consumir una dosis cada 6 u 8 horas por un periodo no mayor a 5 días. Generales: Es importante usar con precaución Bregamin en aquellos pacientes con problemas cardiovasculares como, hipertensión arterial, así como en pacientes con problemas renales, hipertrofia prostática o hipertiroidismo, asimismo debe ser usado con precaución en pacientes diabéticos ya que contiene un 50% de azúcar . Alergias: Este medicamento no debe ser consumido por aquellas personas que hayan presentado alergias a Fenilefrina, Clorfenamina o Paracetamol. Mezcla con alcohol: No se recomienda mezclar este medicamento con alcohol ya que puede aumentar los efectos sedantes de la Clorfenamina, y el metabolismo del paracetamol. Mezclar con otros medicamentos. Los componentes de Bregamin, generalmente son compatibles con otros medicamentos, sin embargo pueden llegar a interactuar con otros medicamentos depresores del sistema central como diazepam, además puede alterar los efectos de sulfonilureas como Sulfametoxazol o Pioglitazona y disminuir los efectos de la heparina. Compatibilidad de Bregamin en Embarazo y Lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO El uso de Bregamin no se recomienda durante el embarazo: a pesar que de acuerdo con lo publicado por facmed unam algunos de sus componentes como el Paracetamol son seguros durante el embarazo, otros como la Clorfenamina aún no han sido estudiados lo suficiente, por lo que su uso se reserva para aquellos casos en los que los beneficios sean superiores a los riesgos. El uso de Bregamin no es recomendado durante la lactancia materna, ya que según informes de e-lactancia a pesar de que es poco probable que la Fenilefrina aparezca en la leche materna, su uso prolongado pude alterar la presión arterial, además está comprobado que la Clorfenamina puede llegar a disminuir la producción de leche materna si se utiliza durante las primeras semanas después del parto, mientras que sus efectos sedantes pueden resultar peligrosos. Efectos Secundarios La mayoría de las personas aceptan muy bien el Bregamin, no obstante, es posible que se presenten algunos efectos indeseados en menos del 1% de las personas, entre los efectos registrados se encuentran: Sistema nervioso: mareo, vértigo, nerviosismo, somnolencia. Sistema digestivo: pérdida de apetito, nauseas, vomito, estreñimiento, dolor abdominal, sequedad de boca y garganta. Aparato cardiovascular: palpitaciones, hipotensión. Sistema genitourinario: retención urinaria. Otros: urticaria, sudoración excesiva. Es importante que frente a la persistencia de cualquiera de los síntomas mencionados por más de 5 días consulte a su médico inmediatamente. Fuentes médicas Bregamin es un medicamento antigripal cuyos componentes principales son Clorfenamina, Fenilefrina y paracetamol, tres sustancias con propiedades para controlar malestares simples y algunas afecciones comunes del sistema respiratorio. Por ello, este medicamento es ideal para tratar: Resfriado común, una de las enfermedades más comunes, que cursa con malestar general, tos, nariz tapada y estornudos; suele durar hasta dos semanas y aunque no tiene cura, es posible controlar sus síntomas. Gripa o influenza, una infección viral que afecta el sistema respiratorio generalmente una vez al año, y que suele ser similar a un resfriado, pero a diferencia de este sus síntomas suelen ser más intensos, además de causar fiebre y dolores de cabeza. Rinitis alérgica, una reacción producida por una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante estímulos simples como el polen o el pelo de las macotas, que causa congestión nasal, comezón en la nariz y lagrimeo. Los beneficios de Bregamin se deben a que combina los efectos antialérgicos que t